



# KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS A VÉDŐNŐI HÁLÓZAT SZAKEMBEREIVEL

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  
Sárbogárdi Tagintézménye

2018.03.06.

# RIZIKÓFAKTOROK

- Az édesanya állandó gyógyszert szed (pl. pajzsmirigy működésre), dohányzás, alkoholfogyasztás, drog
- Koraszülöttség
- Túlhordás
- Fertőzött magzatív
- Ikerterhességek
- Császármetszés
- Elhúzódo vajúdas, oxigén hiány
- Az újszülött izomtónusának eltérései
- Fejlődési rendellenességek (dongaláb vagy ajak- és száypad-hasadék)
- Genetika, genetikai adottságok
- Szociális körülmények



# A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS TÜNETEI 1.

- Nehezen megnyugtatható, keveset alszik vagy aluszékony
- Táplálási problémák, renyhe szopóreflex
- Nem emeli fejét 3 hónaposan
- Ferde nyak, törzs, kötött csípő, végtagok aszimmetrikus mozgása
- Nem figyel fel tárgyakra, nem követi őket szemével
- Nem figyel fel zajokra



# A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS TÜNETEI 6 HÓNAPOS KORIG

- Kezeit nem nézi
- Nem nyúl játék után
- Csak pillanatokra figyel az emberi arcra vagy más tárgyra
- Mosoly, kacagás, hangadás nem jelenik meg
- Hason nem támaszkodik fel, nem tartja a fejét



# A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS TÜNETEI 1 ÉVES KORIG

- A mozgásfejlődésből kimaradt (vagy jelentős késéssel indul) a kúszás vagy mászás
- Nem áll fel, pár lépést nem tesz meg
- Nem gógicsél, nem gagyog, vagy ez jelentősen késik
- Nevére, tiltásra nem figyel
- Egyszerű utasítást nem ért meg ( pl. Intsél „pá-pá”-t)
- Játékokat csak ütögeti, vagy dobálja
- Problémák a darabos étel fogyasztásával



# A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS TÜNETEI 3 ÉVES KORIG

- Beszédében csak pár szót használ
- Főként mutogatással érteti meg magát
- Szobatisztasága késést mutat
- Kanalat nem fog
- Mozgása ügyetlen, darabos, sokat esik
- Nem tud guggolni
- Lábujjhegyen jár
- Mozgékony, nincs veszélyérzete
- Bokája bedől, gerincferdeség, mellkas deformitás
- Figyelme pár percre köthető le
- „Ugrál” a játékok között
- Nem utánoz, nem épít
- Nem rajzol, nem firkál( vagy csak ritkán)



# A TÉVÉNÉZÉSRŐL

- **Ha nem nézi senki, kapcsolj ki!!**
- Ideális ha 2-3 éves koráig nem nézi a gyermek a tévét, később is csak időkorlátok között
- Válogatott, életkornak megfelelő
- Szülővel nézze a mesét
- Lassabb mesék(pl.: A kockás fülű nyúl, Kisvakond, Frakk, Bogyó és Babóca)
- Ne az egész napot tegye ki
- Távirányítót eltenni
- A gyerekszobában ne legyen tévé
- Helyette a szülő meséljen



# A CUMIZÁSRÓL

- Megnyugtató a gyermeknek
- „Állkapocsnak megfelelő cumi” → reklámfogás
- Leszoktatja a nyelvet
- A nyelv felső nyugalmi helyzete a cumitól le, vagy a két fogsor közé kerül, más esetben a felső fogsort nyomja
- 5 kg súly, deformításokat okoz (szájpadlás, fogsor)
- → artikulációs problémák
- Fogszabályozás





# HA MÁR CUMI....



- **Puha, kis átmérőjű, kerek cumi**
- **A gyerek ne játsszon és ne beszéljen cumival a szájában!**
- **A cumi ne legyen szem előtt( pl.: cumilánc)**
- **Minél hamarabb leszoktatni**
- **Kisebb trauma a leszoktatás, mint később az évekig tartó fogszabályozás**



# GYAKORLATI TANÁCSOK A SZÜLŐKNEK

- FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye és a Csipike Egyesület közös kiadványa

